

ТУБЕРКУЛЕЗ:

РИСКИ СИМПТОМЫ ПРОФИЛАКТИКА



Туберкулез – чрезвычайно опасное инфекционное заболевание. Даже в условиях повсеместной иммунопрофилактики туберкулез ежегодно уносит миллионы человеческих жизней по всему миру. Только в России от осложнений туберкулеза умирают 20 тысяч человек в год.

Около одной трети населения мира инфицировано бактерией туберкулеза. Повышенному риску развития туберкулеза подвергаются люди с ослабленной иммунной системой.

ФАКТОРЫ РИСКА

- ✓ НЕДАВНЕЕ ИНФИЦИРОВАНИЕ
- ✓ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- ✓ ТЕРАПИЯ ИММУНОСУПРЕССИВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
- ✓ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОСТЬ (*риск выше в 26-31 раз*)
- ✓ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ, АЛКОГОЛЯ, ТАБАКА
- ✓ ПЛОХОЕ ПИТАНИЕ
- ✓ БОЛЬШАЯ СКУЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
- ✓ КОНТАКТ С БОЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

СИМПТОМЫ

КАШЕЛЬ ИЛИ ПОКАШЛИВАНИЕ С ВЫДЕЛЕНИЕМ МОКРОТЫ, ЧАСТО С КРОВЬЮ

БЫСТРАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ И ПОЯВЛЕНИЕ СЛАБОСТИ

СНИЖЕНИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ АППЕТИТА, ПОТЕРЯ В ВЕСЕ

ПОВЫШЕННАЯ ПОТЛИВОСТЬ, ОСОБЕННО ПО НОЧАМ

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО 37-37,5 С

ВАЖНО:

При сохранении хотя бы одного симптома в течение трех недель, необходимо обратиться к терапевту. При подозрении на туберкулез необходимо сделать флюорографию и сдать анализ мокроты. Во всех подозрительных случаях пациента направляют в туберкулезный диспансер для дополнительного обследования

ОСТАНОВИТЬ ЭПИДЕМИЮ
ВОЗМОЖНО, ЛИШЬ
ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ
ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ



ПРОФИЛАКТИКА

С целью выявления туберкулеза необходимо ежегодное диспансерное наблюдение и флюорографическое обследование.

Возбудитель туберкулеза – *Mycobacterium tuberculosis* (лат.), палочка Коха



Отдел здравоохранения администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Измайловский пр., 10, e-mail: zdrav2@tuadm.gov.spb.ru